





تفاصيل البحث:

TIIE EFFECT OF ORTIIODONTIC TREATMENT ON : عنوان البحث TIIE EFFECT OF ORTIIODONTIC TREATMENT ON

Anterior open bite is relatively a common problem met by the corthodontist in clinical practice and requires adequate treatment for the correction of the vertical mal relationship.

Anterior open bite malocclusion is often associated with speech defects. The sounds usually affected are the sibilants.

Anterior open bite permitting anterior escapage interferes with the normal production of sibilants . .It "\vas ailned in this presented study to assess the speech defects associated with anterior open bite deformity. Also to assess the improvement, if any. of these defects after the completion of orthodontic treatment and bite closure. The sample treated consisted of twenty patients, nine males and eleven females .ranged in age from twelve to twenty years

: رسالة علمية

Friday, December 07, 2007:

نوع البحث

الوصف

تاريخ الاضافة على الموقع

الباحثون:

اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني aafifi@kau.edu.sa باحث استاذ مشارك

الصفحة الرئيسية

✔ عن الكلية

✔ الادارة

🕻 الشؤون التعليمية

🕻 العيادات والمعامل

🕻 الوحدات

🕻 الدبلومات

آخر الأخبار
 أسئلة متكررة

· المشاريع والبحوث العلمية

🕻 دليل المنسوبين

> المواد

🕻 ألبوم الصور

✔ مواقع مفضلة

ك الجوائز والاعتمادات

🕻 للإتصال بنا

🖸 SHARE

₽ 99 **₽** ...)

English | الصفحة الرئيسية | اتصل بنا